





Übersicht der zugelassenen COVID-19-Impfstoffe

Hersteller/ Impfstoffbezeichnung	Altersempfehlung der STIKO	Anwendung	Impfstofftyp	Nötige Impfdosen	Empfohlener Impfabstand*	Wirksamkeit**	Schutz nach 2. Impfung	EU-Zulassung
BioNTech/ Pfizer <i>(Comirnaty)</i>	ab 16 Jahren	intramuskulär	mRNA		Zwischen 3 und 6 Wochen	bis zu 95%	Ab Tag 7	21.12.2020
Moderna <i>(COVID-19 Vaccine Moderna)</i>	ab 18 Jahren	intramuskulär	mRNA		Zwischen 4 und 6 Wochen	bis zu 95%	Ab Tag 14	06.01.2021
AstraZeneca *** <i>(Vaxzevria)</i>	ab 60 Jahren	intramuskulär	vektorbasiert		12 Wochen	bis zu 80%	Ab Tag 15	29.01.2021
Johnson& Johnson <i>(COVID-19 Vaccine Janssen)</i>	ab 18 Jahren	intramuskulär	vektorbasiert		Einzel-dosis	bis zu 70%	Ab Tag 28 (nach der Einzeldosis)	11.03.2021

*Nach Angaben der Produktinformation und aktuellen Empfehlungen durch die Ständige Impfkommission

**Die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, sinkt bei den Geimpften um den genannten Prozentsatz. Jeder zugelassene COVID-19-Impfstoff schützt vor schwerem Krankheitsverlauf.

***Bei Personen unter 60 Jahren ist die Impfung mit Vaxzevria nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz möglich. Für Personen unter 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit Vaxzevria erhalten haben, wird derzeit eine Zweitimpfung mit einem RNA-Impfstoff empfohlen.